

СЕДЕЛАЙТ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Седалайт.

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав: каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит:

Валериана	50 мг;
Мята перечная	25 мг;
Мелисса лекарственная	25 мг.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ: N05CM09.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Седалайт является препаратом растительного происхождения с мягким седативным действием.

Экстракт Валерианы - уменьшает возбудимость центральной нервной системы, усиливает действие снотворных, обладает также спазмолитическими свойствами.

Экстракт мелиссы - оказывает мягкое успокаивающее действие, обладает умеренными спазмолитическими свойствами.

Экстракт мяты перечной - оказывает спазмолитическое, успокаивающее, желчегонное, противорвотное и местно раздражающее действие.

Фармакокинетика:

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

Показания к применению:

Седалайт применяется как успокаивающее средство при:

- нервном возбуждении;
- бессоннице;
- неврозах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- беспокойствах;
- нарушении сна.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- артериальная гипотензия;
- детский возраст до 3 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети от 12 лет: при нервозности 2 – 3 таблетки 2 – 3 раза в сутки.

При бессоннице 2 – 3 таблетки за час до сна.

Дети от 3 до 12 лет: прием только под надзором врача. Дозу следует подбирать соответственно к массе тела (1 таблетка 1 – 3 раза в сутки).

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

При длительном применении таблеток привыкания не наблюдается.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Токсического действия препарата не отмечено. Одноразовый прием приблизительно 60 таблеток Седалайт может повлечь возникновение таких симптомов, как утомляемость, спазм в брюшной полости, беспокойство, головокружение, тремор рук и расширение зрачков. Эти симптомы исчезают в течение 24 часов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не известна.

Особые указания:

Негативное действие препарата Седалайт при беременности и лактации не отмечено.

Как и в случае использования, препарат вообще особенной осторожности следует придерживаться в первом триместре беременности и в период грудного кормления, поэтому решение про применение препарата должен принять врач.

В рекомендованных дозах препарат не влияет на способность управлять автомобилем и механизмами.

Форма выпуска:

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в каждом блистере. 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Сурия Хёрбал Лтд.,
Индия